



***Сведения о количестве обращений по поводу
присасывания клещей на территории
Ляховичского района за 9 месяцев 2026 года:***

За **9 месяцев** 2026 года в медицинские учреждения района по поводу укусов клещей обратились 87 человек (за 9 месяцев 2025 г.- 47 чел.), в том числе до 17 лет - 27 человек (31,0 %). В большинстве случаев укусы зарегистрированы в лесной зоне, сельской местности (на приусадебных и дачных участках), на

территории жилой застройки города. Среди населения зарегистрировано 7 случаев заболевания Лайм - боррелиозом (болезнь Лайма)

С целью снижения численности переносчиков клещевых инфекций и предупреждения распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами клещей, проводились акарицидные обработки от клещей на территориях зон отдыха, летних оздоровительных лагерей, парков, скверов, лесопарковых территориях, приусадебных участков и т.д. За 9 месяцев текущего года на территории района в борьбе с переносчиками клещевых инфекций проведены обработки на площади 7,27 га.

Активность и численность клещей в природе зависит от климатических факторов, а количество укусов клещей зависит от посещаемости населением лесных лесопарковых зон в сезон активности клещей. Чтобы избежать укусов клещей при работе на дачных участках, на пикниках и выездах на природу, прогулках в парках и скверах, выгуле собак, жители района должны повысить бдительность и обязательно соблюдать все меры предосторожности, уделяя особое внимание индивидуальной защите.

**Соблюдайте меры личной профилактики, не допускайте нападения и
присасывания клещей, выполняя следующие правила поведения:**

- следует одеваться так, чтобы максимально закрыть открытые участки тела, в одежду светлых тонов (чтобы легче заметить клеща), в качестве обуви лучше использовать резиновые сапоги или ботинки, а голову прикрыть косынкой, кепкой или капюшоном;
- для отпугивания клещей необходимо использовать репелленты, которые можно купить в аптеках, магазинах, маркетплейсах (перед применением обязательно ознакомиться с инструкцией). **Справочно: средства от комаров и мошек на клещей не действуют.;**
- необходимо каждые 2 часа проводить само- и взаимоосмотры на наличие присосавшихся клещей;
- после посещения лесопарковых зон отдыха, дачных участков, обязательно осматривать одежду, шерсть домашних животных, проводить ревизию принесенных в дом из леса и дачных участков вещей (растения, рюкзаки, рыболовные снасти, охотничье обмундирование и др.);
- во время прогулок с детьми в парках и скверах не оставлять коляски с детьми возле деревьев, кустов, передвигаться по тротуарам и дорожкам;
- пикники и привалы на природе устраивать вдали от деревьев и кустарников, на солнечном и расчищенном от сухой травы и валежника месте;
- обработать территорию отдыха - протянуть полотно (желательно из фланели) по траве, это поможет собрать затаившихся клещей;
- во время прогулок идти посередине тропинки, не забираясь в заросли высокой травы и на территории с густым кустарником, чаще всего клещи прикрепляются к одежде человека, когда он касается кустарников, травостоя или садится на траву;

- чтобы обезопасить себя и своих близких от заражения клещевым энцефалитом с алиментарным путем заражения, козье молоко пить после кипячения (**вирус клещевого энцефалита чувствителен к высоким температурам и погибает при 2-х минутном кипячении**) и для выпаса коз использовать только окультуренные пастбища;
- для снижения численности клещей требуется обеспечить благоустройство своих дачных участков, дворовых территорий, проводить уборку прошлогодней листвы, расчистку от бытового и растительного мусора, окультуривание кустарников, выкашивание травы, не допускать захламленности и свалок бытового мусора, уничтожать мышевидных грызунов.

Что делать, если клещ присосался?

- при обнаружении присосавшегося клеща необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую организацию здравоохранения для его удаления. Чем дольше он находится на теле, тем выше опасность заражения клещевыми инфекциями;
- можно самостоятельно удалить присосавшегося клеща прочной ниткой, сложенной вдвое, завязанной как можно ближе у хоботка, покачивая головку клеща со стороны в сторону, или аккуратно захватить пинцетом головку клеща и, поворачивая против часовой стрелки, выкрутить его. Клеща можно удалить ещё с помощью клещевёрта или ручки Лассо. **Внимание!** Ни в коем случае нельзя тянуть и сдавливать клеща, не использовать растительное масло или другие жидкости до и после его удаления во избежание попадания содержимого клеща в ранку. Место укуса обработать йодом или спиртосодержащим раствором, а руки тщательно вымыть с мылом;
- после удаления клеща **обязательно** обратиться к врачу-инфекционисту или участковому врачу общей практики, педиатру для назначения профилактического лечения и установления медицинского наблюдения.

Максимальный профилактический эффект достигается только в том случае, если экстренная профилактика начата в первые 72 часа после укуса клеща!!!

Риск заболеваемости снижается в результате правильно оказанной первой помощи и вовремя начатого профилактического лечения!

Где можно исследовать клеща?

→ В Барановичском зональном центре гигиены и эпидемиологии на платной основе проводятся исследования клещей **методом ПЦР** (полимеразная цепная реакция) на четыре клещевые инфекции (клещевой энцефалит, болезнь Лайма, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз).

Приём клещей осуществляется в **каб. №14** по адресу: г. Барановичи, ул. 50 лет ВЛКСМ, 9. Телефон для справок: **8 (0163) 41-78-62**. Режим работы:

- понедельник с 8:00 до 20:00; перерыв 13.00 - 14.00 (с 18.00 до 20.00 оплата исследования только по ЕРИП);
- вторник - пятница с 8:00 до 16:30 (перерыв 13:00 - 14:00);
- суббота - с 9:00 до 15:00 (приём клещей осуществляется в приёмной).
- воскресенье, праздничные дни - выходные.

Стоимость исследования клеща (по состоянию на **01.10.2026 г.**) методом ПЦР составляет **44,93** руб. Оплата за исследование клеща наличными, картой или через ЕРИП.

Без взимания платы проводятся лабораторные исследования клещей:

- **снятых с лиц**, имеющих медицинские противопоказания к приёму лекарственных средств, предназначенных для профилактики клещевых инфекций (**по направлению организаций здравоохранения**);

- *снятых с детей*, находящихся в санаториях и оздоровительных учреждениях, а также с детей сирот и оставшихся без попечения родителей (**по направлению организаций здравоохранения**).

→ В Брестском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья на платной основе проводятся исследования клещей на наличие возбудителей 4-х инфекций: клещевого энцефалита, болезни Лайма, анаплазмоза, эрлихиоза методом ПЦР. Стоимость исследования клещей методом ПЦР в Брестском областном ЦГЭиОЗ для граждан Республики Беларусь – **46,76 руб.** (при предоставлении паспорта), для нерезидентов РБ – **78,29 руб.** Приём клещей и выдача результатов осуществляется по адресу г. Брест, пл. Свободы, 9, 1-й этаж. Телефон для справок: **8(0162) 53-25-17.**

Режим работы:

- понедельник – пятница с 8.30 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.30 до 14.00);
- суббота с 8.30 до 12.30;
- выходной – воскресенье и праздничные дни.

→ В Пинском зональном центре гигиены и эпидемиологии на платной основе проводятся исследования клещей также методом ПЦР на четыре клещевые инфекции. (*клещевой энцефалит, болезнь Лайма, моноцитарный эрлихиоз, гранулоцитарный анаплазмоз*)

Приём клещей осуществляется в каб. №1 по адресу: г. Пинск, ул. Кустарная, 21. Телефон для справок: **8 (0165) 62-79-69.** Режим работы:

- понедельник - пятница с 8:00 до 16:00; перерыв 13.00-14.00;
- суббота - с 8:00 до 14:00;
- воскресенье, праздничные дни - выходные.

Стоимость исследования клеща - **51,73 руб..** Оплата за исследование клеща наличными, картой или через ЕРИП.

Для проведения лабораторных исследований клеща необходимо предоставить материал (клеща, снятого с пострадавшего), паспорт, заполнить заявление (договор), документы, подтверждающие льготу. При получении результата – документ, подтверждающий оплату.

Как правильно доставлять клеща на лабораторное исследование?

Снятого клеща необходимо поместить в закрытый крышкой флакон с кусочком ваты, смоченной водой (если клещ живой) или сухой флакон, и самостоятельно доставить на исследование, до момента доставки хранить в холодильнике, при этом желательно, чтобы доставка была незамедлительной (оптимальный срок – в течение 3 дней после его снятия с человека). Вместе с тем сроки доставки клеща для исследования действующими нормативно-правовыми документами не регламентированы.

Где можно заказать акарицидную (противоклещевую) обработку?

Акарицидную обработку (против клещей) придомовых территорий, дачных и приусадебных участков проводит отделение профилактической дезинфекции Ляховичского районного центра гигиены и эпидемиологии.

Информацию по интересующим Вас вопросам можно получить в отделении профилактической дезинфекции Ляховичского районного ЦГиЭ.

Телефон для справок: **8(01633) 6-24-41.**

Ляховичский районный ЦГиЭ

2026 год

КЛЕЩИ



И КЛЕЩЕВЫЕ ИНФЕКЦИИ

Клещи являются хранителями и переносчиками многих болезней. Самой распространенной клещевой инфекцией является болезнь Лайма (Лайм боррелиоз) и менее распространенной, но тяжелой – клещевой энцефалит. Относительно недавно (в 2011 году) в клещах был выявлен возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека и моноцитарного эрлихиоза. Один клещ может быть переносчиком одновременно нескольких возбудителей инфекций, и этот факт является не исключением, а нормой. Зараженность клещей возбудителями вышеперечисленных инфекций в Беларуси может достигать 50%, при этом на долю возбудителей микст-инфекций (одновременно несколько инфекций в одном клеще) может приходиться до 36%.

Лайм боррелиоз

Вызывают болезнь боррелии, которые передаются при укусе инфицированного клеща или случайном втирании гемолимфы раздавленного клеща в кожу. Заболевание поражает кожные покровы, центральную нервную систему, опорно-двигательный аппарат. Болезнь может иметь хроническое или рецидивирующее течение, которое иногда приводит к частичной или полной потере трудоспособности. Наиболее известный маркер болезни – появившаяся после укуса клеща эритема в виде красного пятна на коже.



Клещевой энцефалит

Заражение **клещевым энцефалитом** возможно не только через укус инфицированного клеща (трансмиссивный путь), но и при употреблении сырого молока больных коз (алиментарный путь). Клещевой энцефалит имеет не бактериальную, а вирусную природу. Инкубационный период может составлять 30 дней, но в среднем не превышает 7-14 дней. Начало заболевания острое, температура поднимается до 38-39 градусов и держится на таком уровне до двух недель. Появляется головная боль, чувство разбитости, тошнота, рвота, нарушается сон. Возможно нарушение сознания, бредовое состояние. Вначале заболевание клещевым энцефалитом по симптомам схоже с гриппом. В дальнейшем развиваются вялые параличи мышц шеи и плечевого пояса. Могут появиться ощущения ползающих мурашек по коже, заболевшему трудно удержать голову в обычном положении. Клещевой энцефалит в отдельных случаях сопровождается отеком мозга и других органов. Период выздоровления длительный, мышечный тонус восстанавливается частично.



Гранулоцитарный анаплазмоз человека (ГАЧ)

Возбудитель **ГАЧ** проникает в кровь со слюной инфицированного клеща, разносится по всему организму, поражая печень, почки, вызывая воспалительные процессы всех внутренних органов. Инкубационный период в среднем – 2-3 недели. Анаплазмоз начинается с озноба, лихорадки выше 38,5 градусов, которая держится несколько дней. Появляется слабость, катаральные явления, кашель. Затем присоединяются головная, мышечная боль, боли в животе, диарея. Средняя продолжительность болезни – от 10 до 14 дней, в большинстве случаев она протекает легко.



Моноцитарный эрлихиоз человека (МЭЧ)

МЭЧ передается при укусе инфицированного клеща, инкубационный период в среднем составляет 13 дней. При моноцитарном эрлихиозе страдают костный мозг, печень, селезенка, тимус. Симптомы: озноб, лихорадка, высыпания на коже, головная боль, боли в мышцах, суставах. Появляется одышка, могут увеличиваться лимфатические узлы. В случае поражения нервной системы возможны параличи, спутанность сознания, нарушения координации, судороги. Не исключается хроническое течение болезни.



После удаления клеща следует обязательно обратиться к врачу-инфекционисту или участковому врачу-терапевту (педиатру) для назначения антибиотикопрофилактики и установления медицинского наблюдения.

Наиболее эффективна антибиотикопрофилактика при обращении в течение первых трех суток после укуса клеща!

Удаленного клеща, при желании, можно исследовать на наличие возбудителя Лайм боррелиоза, клещевого энцефалита, гранулоцитарного анаплазмоза, моноцитарного эрлихиоза только в вирусологической лаборатории БРЕСТСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦГЭиОЗ.

Прием клещей проводится по адресу: г. Брест, пл. Свободы, 9, 1-ый этаж, каб. 2.

Определение инфицированности иксодовых клещей основными возбудителями заболеваний человека (четыре инфекции) осуществляется методом мультиплексной ПЦР.



БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ! ЗАЩИЩАЙТЕ СЕБЯ ОТ УКУСОВ КЛЕЩЕЙ!